

## 点鼻生ワクチンと注射用不活化ワクチンの比較

	点鼻ワクチン	注射用ワクチン
種類	生ワクチン	不活化ワクチン
投与方法	鼻腔内に噴霧	注射（皮下または筋肉内）
対象年齢	2歳から18歳まで	生後6カ月から
接種回数	1回	6カ月～12歳：2回 13歳以上：1回
主な副反応	鼻水・鼻づまり、軽い発熱	注射部位の痛み・腫れ、発熱
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鼻の粘膜での免疫獲得による発症予防効果</li> <li>・注射が苦手なお子さんでも接種しやすい</li> <li>・接種後に咳、鼻水、鼻閉・咽頭痛・咳などの感冒症状がしやすい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・重症化予防効果</li> <li>・妊婦や免疫抑制剤使用者も使用可能</li> </ul>
接種に際して注意が必要な方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・繰り返す喘鳴の既往があり、喘息症状がある方</li> <li>・鶏肉、鶏卵、その他鶏由来のものやその他のワクチン成分（ゼラチン、ゲンタマイシン、アルギニン）に対して重度のアレルギーのある方やアナフィラキシーの既往がある方</li> <li>・アスピリン服用中の方</li> <li>・免疫が著しく低下している方、または免疫力が著しく低下している人と同居している方</li> <li>・妊娠されている方</li> </ul>	
他のワクチンとの接種間隔	考慮不要	考慮不要